

Piège Delta contre la teigne du poireau

Le piège Delta permet de lutter rapidement et de manière biologique contre la teigne du poireau, appelée aussi ver du poireau.

Le ver du poireau (*Acrolepiopsis assectella*) est la larve d'un petit papillon de nuit fréquent dans les potagers qui peut ravager les poireaux, oignons, échalotes et ail. Les premiers papillons s'accouplent en avril-mai. Une femelle vit environ un mois et demi et disperse jusqu'à une centaine d'œufs sous les feuilles des plantes attaquées. Chaque œuf donne une petite chenille qui se nourrit de la plante en creusant des galeries d'abord dans les feuilles et ensuite dans les tiges ou dans les bulbes. Après environ 15 jours, elle finit par former une nymphe d'où émergera un papillon au bout de 12 jours environ.

Comment fonctionne le piège Delta ?

Le piège Delta à phéromones contient la phéromone sexuelle femelle de la teigne du poireau, qui attire les mâles. L'accouplement avec les femelles, la ponte des œufs et donc les dégâts sont ainsi évités. Les mâles attirés par le piège volent autour de la capsule de phéromones jusqu'à épuisement, puis ils tombent sur le fond englué. Les papillons ne parviennent pas à sortir du piège et finissent par mourir. Lors de la première année d'utilisation du piège Delta, il y aura encore des dégâts aux tiges ou bulbes mais ils diminueront d'année en année, pour finalement être réduits à néant après environ trois ans d'utilisation du piège Delta. S'il y a des problèmes de teignes du poireau dans le voisinage, il est recommandé de suspendre préventivement un piège Delta chaque année.

Montage et placement du piège Delta

Composition

- Une cordelette
- Un piège en plastique
- Quatre fonds englués
- Deux capsules à phéromones

Montage

- Plier le piège en forme de triangle ouvert.
- Plier d'un côté le rabat vers le haut, et glisser chaque extrémité de ce rabat à travers les fentes sur le côté du piège, de manière à ce que le rabat reste en position.
- De l'autre côté du piège, glisser le fond englué à l'intérieur, avec la colle vers le haut. Plier ensuite l'autre rabat vers le haut, et engagez les extrémités dans la fente sur le côté du piège.
- Sortir la capsule de phéromones du sachet en aluminium, et la placer au milieu sur le fond englué. Ne pas toucher la capsule à main nue, afin d'éviter d'en altérer l'odeur.
- Introduire la cordelette dans les trous du haut du piège Delta, et l'utiliser pour fixer le piège à une branche.
- Suspendre le piège dans un endroit aérer, à hauteur des yeux.
- Changer le fond englué lorsque celui-ci est couvert de papillons, en veillant à replacer la capsule (sans la toucher à main nue).

Placement

Le piège doit être placé à partir de la mi-avril, à raison d'un piège par plate-bande de poireaux (ou d'oignons, d'échalotes, d'ail). La capsule de phéromones est active durant 6 semaines maximum. Elle doit donc être remplacée après cette durée afin de couvrir toute la période de vol.

Conservation

Les capsules de phéromones se conservent au réfrigérateur dans un pot fermé, de manière à ce que les odeurs du réfrigérateur ne se mêlent pas à celles de la capsule de phéromones. Les capsules de phéromones peuvent être conservées durant 2 ans au congélateur, dans leur emballage d'origine et dans un pot fermé.

La période de traitement

Janv - Févr - Mars - **Avr - Mai - Juin - Juill - Août** - Sept - Oct - Nov - Déc