



# diatosect

tegen bloedmijten en vlooiën  
contre les poux rouges et les puces



bestrijdt en voorkomt – zonder chemisch insecticide  
lutte contre et prévient l'infestation – sans insecticide chimique

## DIATOSECT voor pluimvee tegen bloedmijten en vlooiën

Diatosect is een poeder ter bestrijding van bloedmijten (ook bloedluis genoemd) en vlooiën. Het is een natuurlijke en efficiënte oplossing voor problemen met ectoparasieten (vlooiën en bloedmijten) bij kippen, ander pluimvee en in vogelkooien. Het bestaat uit diatomeeënarde (fossiele, microscopisch kleine exoskeletten van algen) en is 100% van natuurlijke oorsprong.

Schadelijke insecten zoals bloedluizen en vlooiën worden met het middel ingevoerd (tijdens de toepassing of door te bewegen in het uitgespreide middel). De diatomeeënarde ontvet de buitenste beschermende waslaag waardoor de insecten uitdrogen. Het ongedierte sterft binnen enkele uren. Een lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid kan de werking van Diatosect met 1-2 dagen vertragen. Dankzij dit werkingsmechanisme kunnen de insecten tegen Diatosect geen resistentie opbouwen, wat wel mogelijk is bij gebruik van traditionele insecticiden.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Met een mes snijd je het bovenste topje van de spits tuit eraf. De spits tuit laat toe om het poeder gericht te doseren door op de verpakking te duwen. Het poeder aanbrengen waar regelmatig insecten gezien worden en waar ze zich kunnen schuilhouden: op en rond zitstokken, in kieren, spleten, uithoeken en barsten, onder voorwerpen...

**Dosis: 30–50 gram/m<sup>2</sup> of 5–10 gram/lopende meter als barrière** (laagje van 2 mm dik en 0,5–2 cm breed). Poeder uniform en zichtbaar aanbrengen. Twee tot 3 behandelingen, telkens met een interval van 8 dagen, zijn wenselijk. De behandeling ook herhalen als het poeder verdwenen is of nat geworden is.

### VOORZORGS- EN EERSTE HULPMAATREGELEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof (poeder) vermijden. Contact met de ogen vermijden. NA INADEMING: persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze makkelijk kan ademen. Bij onwel voelen, Antigifnummer of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie, een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens te hergebruiken. Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. **Tel. Antigifnummer: 070 245 245.**

### VERWIJDERING NA BEHANDELING

Droog, los poeder niet verwijderen aangezien dit een preventieve werking heeft. Nat, vervuild of aangekoekt poeder verwijderen en alvorens met het huisvuil. Lege verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt (containerpark).

Naam / Nom: DIATOSECT – INSECTICIDE – ACARICIDE (PT18)  
Gebruikers / utilisateurs: groot publiek (niet-professioneel) / grand public (non-professionnel)  
Formulering / formulation: CP – contactpoeder/poudre de contact  
Werkzame stof/matière active: 100% diatomeeënarde/terre de diatomées (CAS 61790-53-2)  
Toel. houder/Dét. d'aut.: Bio Services Int., Jagershoek 13, B-8570 Vichte, +32 (0) 56 77 24 34  
www.bsi-products.com • Registratienummer/N° d'enregistrement: BE-REG-00293  
Lotnr. en vervaldatum/N° et date limite d'utilisation: zie verpakking/voir emballage

## DIATOSECT pour volaille contre les poux rouges et les puces

Diatosect est une poudre destinée à la lutte contre les poux rouges et les puces. C'est une méthode naturelle et efficace pour résoudre le problème des ectoparasites des poules et d'autres oiseaux. Le produit s'utilise dans les cages ou en volières. Le produit est constitué de terre de diatomée (des exosquelettes fossiles et microscopiques d'algues) et donc 100% d'origine naturelle.

Les parasites, tels que les poux rouges et les puces, se couvrent eux-mêmes de poudre par suite de leur propre activité, ou bien sont saupoudrés lors de l'application. La terre de diatomées entraîne l'élimination des graisses de la cuticule et la déshydratation des insectes. Les nuisibles meurent au bout de quelques heures. À basses températures ou en présence de forte humidité de l'air, l'effet de Diatosect peut être retardé de 1 à 2 jours. Grâce au mécanisme d'action de Diatosect, le développement de résistance par les insectes n'est pas possible, contrairement aux insecticides traditionnels.

### MODE D'EMPLOI

Avec un couteau, vous coupez la partie supérieure du bec pointu. Le bec pointu permet de doser avec précision la poudre en appuyant sur l'emballage. Appliquer la poudre aux endroits où les insectes sont régulièrement aperçus ou peuvent se cacher: sur les perchoirs, dans les fentes, les fissures, les recoins, sous des objets et à tout endroit utilisé comme refuge par les parasites.

**Dose: 30–50 g/m<sup>2</sup> ou 5–10 g/ mètre courant** comme barrière (couche de 2 mm d'épaisseur et 0,5–2 cm de largeur). Appliquer la poudre de manière uniforme et visible. Il est conseillé de faire 2 ou 3 traitements avec un intervalle de 8 jours. Répéter l'application quand la poudre a été dispersée ou a pris de l'humidité.

### CONSEILS DE PRUDENCE ET DE PREMIERS SECOURS

Tenir hors de portée de des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec les yeux. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin ou le Centre Antipoisons en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de malaise. **Tel. Centre Antipoisons: 070 245 245.**

### ÉLIMINATION APRÈS TRAITEMENT

Ne pas éliminer la poudre sèche et libre parce qu'elle a une action préventive. Éliminer la poudre humide, contaminée et/ou croûtée avec les ordures ménagères. Éliminer l'emballage vide dans un centre de collecte de déchets (parc à conteneurs).

200g e 

BSI0320etDiatK200g\_64221

5 420046 642210